

レジメン名	リンパ球除去療法（アベクマ）				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	5 days
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	76.0% 抗菌薬、G-CSF製剤
	貧血	66.0% 輸血など
	血小板減少	54.0% 輸血など
その他	サイトカイン放出症候群	88.0% トシリズマブなど
	神経学的事象	15.0% 対症療法

レジメン内容（支持療法を含む）

				day		1	2	3	4	5
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●		
2	エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴静注	200mL/hr		●	●	●		
3	フルダラ 生理食塩液	30mg/m ² 100mL	点滴静注	200mL/hr		●	●	●		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●		

内服抗がん剤・支持療法薬

				day		1	2	3	4	5
Rp	薬剤名	投与量	用法							
1	カイトリル	2mg	内服			●	●	●		