

レジメン名		在宅BLIN（45kg未満）72時間用			
対象がん種	悪性リンパ性白血病	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	3日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)			休薬完了
1	ビーリンサイト点滴静注用35μgミズ(注射用水) 生理食塩液 1「ハ」イアルを水3mlで溶解、秤取量は▲必要量確認表▲参照 ※手計算しない※ フィルター通して * 残量あっても72時間で交換	45μg/m2 20ml 270ml	点滴静注	3.3ml/h		●		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3
1	なし							

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	サイトカイン放出症候群	46.2%	添付文書に準じる
	血小板減少	34.6%	添付文書に準じる
その他	出血性膀胱炎	頻度不明	
		0.0%	
		0.0%	