レジメン名		AML-D11 : CT											
対象がん種	急性骨髓性白血病	対象患者		催吐リスク	中等度								
				1コースの日数	14日間								
				投与予定回数									
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限									
※有の場合薬剤名													

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)												
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)									
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明										
その他												

レジメン内容(支持療法を含む)

	メン内容(支持療法を含む) 				day	1	2	3	4	5	<u> </u>	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)			- 3		 	 	, '			10	''	12		休薬完了
1	生理食塩液50ml ホスアプレピタント前フラッシュ用	20ml	点滴静注	50ml/h		•													
2	ホスアプレピタント点滴静注用 グラニセトロン静注液 デキサート注射液 生理食塩液50ml	3.0mg/kg(最大150mg) 40µg/kg 0.1mg/kg(最大4.0mg) 50ml	点滴静注	50ml/h		•													
3	生理食塩液50ml ホスアプレピタント後フラッシュ用	20ml	点滴静注	50ml/h		•													
4	グラニセトロン静注液 デキサート注射液 生理食塩液50ml	40μg/kg 0.1mg/kg(最大4.0mg) 50ml	点滴静注	50ml/h			•												
5	生理食塩液50ml テラルビシン前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		•	•												
6	テラルビシン20mg 生理食塩液100ml 心電図モニター装着	25mg/m2 100ml	点滴静注	1時間		•	•												
7	生理食塩液50ml テラルビシン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		•	•												
8	生理食塩液50ml キロサイド前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		•	•	•	•	•	•	•							
ç	キロサイド注40mg 生理食塩液50ml	100mg/m2 50ml	点滴静注	1時間		•	•	•	•	•	•	•							
10	生理食塩液50ml キロサイド後フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		•	•	•	•	•	•	•							

内服抗がん剤・支持療法薬

	1 1/1/10	1) 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	
Ī	Rp	薬剤名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Г	1	なし																	