レジメン名	移植後短期MTX10-7				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	難治	催吐リスク	最小度
	急性骨髄性白血病			1コースの日数	14 days
	悪性リンパ腫			投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制		抗菌薬、G-CSF製剤、輸血
その他	粘膜障害		ロイコボリン
	腎障害		
	肝障害		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)															休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		●			●					●				
2	メソトレキセート 生理食塩液	10mg/m^2 50mL	点滴静注	300mL/hr	幹細胞輸注 24時間後	●														
3	メソトレキセート 生理食塩液	7mg/m^2 50mL	点滴静注	300mL/hr	10時			●			●					●				
4	ロイコボリン 生理食塩液	10mg/m^2 20mL	静注	静注	day1のMTXの 12時間後	●														
5	ロイコボリン 生理食塩液	10mg/m^2 20mL	静注	静注	day1のMTXの 18時間後		●													
6	ロイコボリン 生理食塩液	10mg/m^2 20mL	静注	静注	day1のMTXの 24時間後		●													
	ロイコボリン 生理食塩液	7mg/m^2 20mL	静注	静注	4時				●	●			●	●				●	●	
	ロイコボリン 生理食塩液	7mg/m^2 20mL	静注	静注	10時				●			●	●				●	●		
7	ロイコボリン 生理食塩液	7mg/m^2 20mL	静注	静注	16時				●			●	●				●	●		
8	ロイコボリン 生理食塩液	7mg/m^2 20mL	静注	静注	22時			●	●			●	●				●	●		
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		●			●					●				
10																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	なし																			