レジメン名	IC PCE (2回目以降)				
対象がん種	頭頸部がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	7
				投与予定回数	7
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	80.0%	G4では次回1段階減量、G2以下になるまで延期
その他	発疹	91.4%	保湿薬、ステロイド薬、事前の皮膚科コンサルト

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	15分		●						
2	デキサート ポララミン ファモチジン 生理食塩水	6.6mg 5mg 20mg 100ml	点滴静注	15分		●						
3	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/m2 250ml	点滴静注	1時間		●						
4	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC1.5 250ml	点滴静注	1時間		●						
5	生理食塩水	50ml	点滴静注	600ml/h		●						
6	アービタックス 生理食塩水	250mg/m2 250ml	点滴静注	1時間		●						
7	生理食塩水	100ml	点滴静注	1時間		●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											