レジメン名	Retifanlimab+CBDCA+wPTX				
対象がん種	肛門管扁平上皮癌	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	47%(35%)	殺細胞性抗がん薬の減量、中止、延
	貧血	66%(20%)	輸血
	血小板減少症	14%(3%)%	殺細胞性抗がん薬の減量、中止、延
その他	甲状腺機能低下症	14%(1%)	甲状腺ホルモン補充。
	かゆみ	7%(1%)	抗ヒスタミン薬、ステロイド外用、
	末梢神経障害	11%(0%)	殺細胞性抗がん薬の減量、中止、延

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		•																										
2	生食 ジニイズ	100mL 500mg	点滴静注	240mL/h		•																										
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		•																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	なし																															