

レジメン名	キイトルーダ+バクリタキセル+カルボ毎週（術前）				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	23.6% G-CSF製剤の使用、減量の検討
	貧血	25.3% 輸血の検討、減量の検討
その他	嘔気嘔吐	25.5%
	脱毛	60.2%
	自己免疫関連症状	33.5%

レジメン内容（支持療法を含む）

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●							●														休薬完了
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30分			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																					
4	デキササート ファモチジン ボラミン 生食	9.9mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●							●														
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●							●														
6	バクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m ² 250mL	点滴静注	1時間			●							●														
7	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC: 1.5 250mL	点滴静注	1時間			●							●														
8	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●							●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	グラニセトロン	2mg	投与前		●							●								●						