レジメン名	R-GCD療法2コース目				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	75.0%	G-CSF、抗菌薬など
	血小板減少	88.0%	輸血、薬剤減量など
	貧血	35.0%	輸血、薬剤減量など
その他	感染症	23.0%	抗菌薬など
	吐き気	3.0%	
	心関係	13.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100ml/h		●							●													
2	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200ml/h		●																				
3	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 39.6mg 100mL	点滴静注	30分		●																				
4	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/h									●													
5	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m2 337.5/m2	点滴静注	備考参照									●													
6	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分		●							●													
7	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC=5 250mL	点滴静注	1時間		●																				
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デキサメサゾン	40mg/body	化学療法前				●	●	●																	
2	イブプロフェン	200mg	リツキシマブ前										●													
3	その他予防薬等																									