レジメン名	TOPO/CTX				
対象がん種	神経内分泌新生物	対象患者	再発	催吐リスク	中等度
			難治	1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	49.0%	
	血小板減少	60.0%	
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	ソリューゲンG	125ml/m2	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●																
2	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr																						
2	プロイメンド 生食	3mg/kg（MAX 150mg） 100ml	点滴静注	100ml/hr		●																				
	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																				
4	グラニセトロン デキサート 生食	0.04mg/kg 0.15mg/kg（MAX 4mg） 50ml	点滴静注	200ml/hr		●																				
	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 50ml	点滴静注	200ml/hr			●	●	●	●																
6	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●	●	●	●	●																
7	ハイカムチン 生食	0.75mg/m2 100ml	点滴静注	200ml/hr		●	●	●	●	●																
8	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●	●	●	●	●																
9	エンドキサン 生食	250mg/m2 100ml	点滴静注	100ml/hr		●	●	●	●	●																
10	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●	●	●	●	●																
11	ソリューゲンG	125ml/m2	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									