

# 病院フォーミュラリ Clostridioides difficile 感染症 (CDI) 治療 (成人)

可能なかぎり現行 (発症時) の抗菌薬投与終了を検討する

発症既往・難治の評価

初発例

**メトロニダゾール**  
(フラジール内服錠250mg)  
1回 500mg 1日3回 10日間経口投与

メトロニダゾールに対するアレルギーや副作用等によりメトロニダゾールが使用できない場合:

**バンコマイシン**  
(塩酸バンコマイシン散0.5g)  
1回 125mg 1日4回 10日間経口投与

CDI発症後8週間以内の再発

**バンコマイシン**  
(塩酸バンコマイシン散0.5g)  
1回 125mg 1日4回 10日間経口投与

難治例

**フィダキソマイシン**  
(ダフクリア錠200mg)  
1回200 mg 1日2回10日間経口投与  
ICD許可薬のため使用前にICDに電話が必要

■内服ができない場合、メトロニダゾール点滴静注 (アネメトロ) を選択する

■難治例とは

1. CDI に対する初回治療以降、2 回以上の再発例
2. バンコマイシン内服治療にもかかわらず、治療終了時までの下痢の改善を認めない例、もしくはショック、腸閉塞、巨大結腸症、腸穿孔を認め、CDI が原因と考えられる例

## 【参考】

商品名	一般名	先発/後発	剤形	総薬剤費 (※)
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	先発	錠剤	¥2,670
塩酸バンコマイシン散0.5g	バンコマイシン	先発	散剤	¥8,644
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	先発	錠剤	¥80,256
アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	先発	注射	¥32,730

※成人において治療1クールにかかる薬剤費の目安

## 参考文献

- ・ Clostridioides difficile 感染症診療ガイドライン2022
- ・ J Infect Chemother.2018; 57(11): 907-914.
- ・ J Infect Chemother.2022; 28(11):1536-1545.
- ・ 各薬剤の添付文書、インタビューフォーム

2026年5月更新Ver.3

作成: 感染制御室 (6511)、薬剤部医薬品情報管理室 (6480)  
本フロー問い合わせ先: 感染制御室専従薬剤師99158