


【外来】新型コロナウイルス感染症 薬剤選択フォーミュラリ



<処方までの手順>

- ① 服薬中の全ての医療用医薬品、市販薬、サプリメントとの相互作用を確認する
相互作用の確認方法：「薬物相互作用マネジメントの手引き※1」参照 または薬剤部※2に確認を依頼
 - ② 患者限定医薬品のため、薬剤部※2へ患者限定申請願書を提出または電話する
- ※1 薬剤毎の手引きは、電子カルテ病院情報管理システム内コロナ対応状況ページに掲載
 ※2 平日日勤帯：DI室 (6480)、夜間休日：調剤室 (6476)

商品名	一般名	投与開始のタイミング	用法用量	1治療当たりの薬価
パキロビッドパック600	ニルマトレルビル/ リトナビル	5日以内	1回0.5枚1日2回、5日間投与	99,027.5円
パキロビッドパック300			1回0.5枚1日2回、5日間投与	62,693.0円
ベクルリー点滴静注用	レムデシビル	7日以内	投与初日に200mg、投与2日目以降は100mgを1日1回点滴静注	185,992.0円 (3日間投与)
ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	5日以内	1回800mgを1日2回、5日間投与	86,596.0円
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル	3日以内	1日目は375mg、2日目から5日目は125mgを1日1回	49,630円

参考：各薬剤添付文書

5学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針

IDSAGuidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19


2026年6月更新 ver.7 感染制御室(6511)、

医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担となる

薬剤部医薬品情報管理室(6480)、呼吸器・感染症・アレルギー内科

本フォーミュラリ問い合わせ先：感染制御室専従薬剤師99158

【入院】新型コロナウイルス感染症 薬剤選択フォーミュラリ



抗ウイルス薬の投与を推奨しない

呼吸器・感染症・アレルギー内科に相談
平日日中：南2階外来PHS 91019
夜間休日：オンコール用スマートフォン

軽症～中等症I (SpO₂ > 93%、肺炎所見なし)

必要に応じて

重症化リスク因子

あり

なし

抗ウイルス薬の投与を推奨しない

内服可能

内服不可

パキロビッドパック300/600 (患者限定医薬品)
eGFR60mL/min以上：パキロビッドパック600
eGFR30mL/min以上60mL/min未満：パキロビッドパック300
6歳以上かつ体重20kg以上40kg未満の小児：パキロビッドパック300
□ 成人および6歳以上かつ体重20kg以上の小児に投与可
□ 特定の薬剤を投与中の患者には禁忌
□ <処方までの手順> ① → ②に沿って処方

パキロビッドパックが使用できない場合

重症化ハイリスクである
重症化ハイリスクとなる基礎疾患の例：末梢血B細胞が1%未満（過去6か月以内に評価）、先天性無ガンマグロブリン血症、造血幹細胞移植後2年未満または活動性移植片対宿主病あり、血液悪性腫瘍で治療中、HIV感染（CD4 <200）、その他の重度の原発性免疫不全、固形臓器移植後等

ない

ある

ラゲブリオ錠 (患者限定医薬品)
□ 18歳以上に投与可
□ 妊婦または妊娠している可能性のある女性には禁忌
□ <処方までの手順> ②に沿って処方

ベクルリー点滴静注用
□ 体重3.5kg以上40kg未満の小児または成人および体重40kg以上の小児に投与可

<処方までの手順>
① 服薬中の全ての医療用医薬品、市販薬、サプリメントとの相互作用を確認する
相互作用の確認方法：「薬物相互作用マネジメントの手引き*1」参照 または薬剤部*2に確認を依頼
② 患者限定医薬品のため、薬剤部*2へ患者限定申請願書を提出または電話する
※1 薬剤部*2の手引きは、電子カルテ病院情報管理システム内コロナ対応状況ページに掲載
※2 平日日勤帯：DI室（6480）、夜間休日：調剤室（6476）

参考：各薬剤添付文書
5学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針
IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19
2026年6月更新 ver.7 感染制御室(6511)、薬剤部医薬品情報管理室(6480)、呼吸器・感染症・アレルギー内科
本フォーミュラリ問い合わせ先：感染制御室専従薬剤師99158

新型コロナウイルス感染症 予防内服フォーミュラリ

新型コロナウイルス感染症患者に最終接触後72時間以内である

重症化リスク因子※あり

重症化リスク因子なし

患者の希望がある

予防内服の適応なし

ゾコーバ錠

(患者限定医薬品)

外来の場合は原則、院外処方

外来患者の薬剤費支払額 (院外処方) : 50,290円~55,000円前後

外来患者の薬剤費支払額 (院内処方) : 55,330円 (税込)

入院患者の薬剤費支払額 : 54,593円 (税込)

(薬剤費以外に技術料等が上乘せされる場合があります)

- ❑ 「予防」の目的で使用した場合には保険給付されない
- ❑ 必ずしもSARS-CoV-2による感染症を発症するとは限らないことを踏まえ、本剤投与の必要性を特に慎重に検討すること
- ❑ 12歳以上の小児及び成人に投与可
- ❑ 特定の薬剤を投与中の患者には禁忌
- ❑ 妊婦または妊娠している可能性のある女性には禁忌
- ❑ <処方までの手順> ① → ②に沿って処方

※メタアナリシスまたは系統的レビューが報告されている疾患、またはCDCの系統的レビューのプロセスを経た基礎疾患や重症化リスク因子

悪性腫瘍／肥満／喫煙歴／心疾患（心不全、冠動脈疾患、心筋症等）／脳血管疾患／慢性腎臓病（透析を含む）／COPD／喘息／間質性肺炎／肺高血圧症／肺塞栓症／気管支拡張症／肝硬変／NASH／アルコール性肝障害／自己免疫性肝炎／1型糖尿病／2型糖尿病／HIV／結核／精神疾患（うつ病を含む気分障害、統合失調症）／認知症／パーキンソン病／固形臓器移植・造血幹細胞移植／身体活動不足／妊娠および最近の妊娠／原発性免疫不全症／コルチコステロイドまたはその他の免疫抑制剤の使用

<処方までの手順>

- ① 服薬中の全ての医療用医薬品、市販薬、サプリメントとの相互作用を確認する
相互作用の確認方法：「薬物相互作用マネジメントの手引き※1」参照 または薬剤部※2に確認を依頼
 - ② 患者限定医薬品のため、薬剤部※2へ患者限定申請願書を提出または電話する
- ※1 薬剤毎の手引きは、電子カルテ病院情報管理システム内コロナ対応状況ページに掲載
※2 平日日勤帯：DI室（6480）、夜間休日：調剤室（6476）

商品名	一般名	用法用量	1回当たりの薬価
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル	1日目は375mg、 2日目から5日目は125mgを1日1回	49,630円