



病院フォアミュラリ グラム陽性球菌：ブドウ球菌推定 (Gram(+))cococcus Cluster) 菌血症の治療選択



治療B 薬剤選択のフロー



注射薬の薬価と投与量

商品名	一般名 (略語)	薬価	1回量 (投与間隔)			血液透析
			CrCl > 50mL/min	CrCl 30~50mL/min	CrCl < 10mL/min	
セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファゾリン (CEZ)	346円/瓶	2g (8時間毎)	2g (12時間毎)	1g (24時間毎) 透析日は透析後に投与	1g (24時間毎) 透析日は透析後に投与
ロセフィン静注用1g	セフトリアキソン (CTRX)	422円/瓶	2g (12時間毎)	投与量・間隔の調整は不要	2g (24時間毎) 透析日は透析後に投与	2g (24時間毎) 透析日は透析後に投与
ピクシリン注射用1g	アンピシリン (ABPC)	481円/瓶	2g (4時間毎)	2g (6時間毎)	2g (8時間毎)	2g (12時間毎) 透析日は透析後に投与
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン (VCM)	980円/瓶				
テイコプラニド点滴静注用200mg「日医工」	テイコプラニド (TEIC)	1,351円/瓶				

初期投与設計は病棟担当薬剤師 (夜間休日は薬剤部当直専用PHS 99199) に依頼する

参考文献

- ・新訂第4版 感染症診療の手引
- ・感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版)
- ・ Clin Infect Dis.2013; 57(9): 1225-33.
- ・ Clin Infect Dis.2009; 49(1): 1-45.