

レジメン名	大量CY120				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	再発・難治	催吐リスク	高度
	急性骨髄性白血病			1コースの日数	3 days
	悪性リンパ腫			投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	抗菌薬、G-CSF製剤、輸血
その他	出血性膀胱炎	利尿薬、メスナ
	心不全	利尿薬など
	電解質異常	点滴で補正

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	休業完了
2	ブロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr		●		
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	110mL/hr		●		
4	エンドキサン 生理食塩液	60mg/kg 500mL	点滴静注	2hr		●	●	
5	ウロミテキサン 生理食塩液	24mg/kg 20mL	静注	エンドキサン終了直後		●	●	
6	ラシックス	10mg	静注	エンドキサン終了直後		●	●	
7	ウロミテキサン 生理食塩液	24mg/kg 20mL	静注	エンドキサン終了4時間後		●	●	
8	ウロミテキサン 生理食塩液	24mg/kg 20mL	静注	エンドキサン終了8時間後		●	●	
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3
1	前頁の備考参照						