レジメン名	Pola-R-CHP療法　2コース目以降				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	30.8%	休薬することがある
	貧血	28.7%	同上
その他	悪心	41.6%	制吐剤など
	末梢性ニューロパ	52.9%	休薬することがある
	下痢	30.8%	整腸剤、止痢剤など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●																				
2	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30分		●																				
3	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m2 337.5ml/m2	点滴静注	備考を参照		●																				
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●																				
5	ポライビー 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 0.09mL/kg 100mL(体重40kg未満は50mL)	点滴静注	30分		●																				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●																				
7	ドキソルビシン 生理食塩液	50mg/m2 100mL	点滴静注	30分		●																				
8	エンドキサン 生理食塩液	750mg/m2 250mL	点滴静注	60分		●																				
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イブプロフェン	200mg	リツキサンあるいはポライビー30分前			●																				
2	カイトリル	2mg	ドキソルビシン30分前			●																				
3	ニューモシスチス予防																									
4	帯状疱疹予防																									
5	プレドニゾロン	100mg	朝昼			●	●	●	●	●																