レジメン名		3w T	CbHP療法	去 初回	
対象がん種	乳がん	対象患者	乳癌	催吐リスク	中等度
			Stage1-3	1コースの日数	21日
			80歳未満	投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし		HER2陽性	投与回数上限	
※有の場合薬剤名		7			

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)												
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)									
血液毒性	好中球減少	66.0%										
	貧血	67.0%										
	血小板減少	19.0%										
その他	心不全	0.6%	循環器内科相談、HP中止を検討									
	悪心、下痢、嘔吐	1%以上	整腸剤、制吐薬等									
	呼吸困難	1%以上	呼吸器内科相談、減量中止を検討									

レジメン内容(支持療法を含む)

<u>~</u>	アン内谷(又付原広を含む)																										
					day	0	1	1 2	2 3	4	5	6	7	7 8	8 9	9 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																						休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	30分			•																				
2	パージェタ 生食	840mg 250ml	点滴静注	60分			•																				
3	トラスツズマブ 注射用水 生食	8mg/kg 0.38ml/kg 250ml	点滴静注	90分			•																				
4	デキサート 生食	6.6mg 100ml	点滴静注	200ml/h			•																				
5	ドセタキセル 生食	75mg/m2 250ml	点滴静注	1時間			•																				
6	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC:6 250ml	点滴静注	1時間			•																				
7	生食	50ml	点滴静注	30分			•																				

内服抗がん剤・支持療法薬

	版) はつい 人 い 水 本																	
R	薬剤名	投与量	用法	day	1	1	2	3	3 4									
	1 グラニセトロンゼリー	2mg	内服			•												
	2 デカドロン	8mg/日	内服		•		•	•	•									