レジメン名	カルケンス+ ガザイバ（3-7コース目）				
対象がん種	慢性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28 days
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血		輸血など
	白血球減少		G-CSF、抗菌薬など
	血小板減少		輸血など
その他	出血		休薬
	感染症		抗菌薬など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																										
2	ガザイバ 生理食塩液	1000mg 210mL	点滴静注	備考参照		●																										
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カルケンス	100mg	内服			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
2	アセトアミノフェン	600-900mg	内服		ガザイバ30分前	●																										