レジメン名	Hyper CVAD B (ALL 60歳未満)				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	0.0%	G-CSF、抗菌薬など
	血小板減少	0.0%	輸血など
	貧血	0.0%	輸血など
その他	口内炎	45.0%	含嗽など
	嘔気	18.0%	制吐剤
	末梢神経障害	12.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●	●	●																		
2	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30min		●																				
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	30min		●																				
4	メソトレキセート 生理食塩液	200mg/m2 250mL	点滴静注	2hr		●																				
5	メソトレキセート 生理食塩液	800mg/m2 500mL	持続静注	22hr		●																				
6	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30min	12時間毎		●	●																		
7	シタラビン 生理食塩液	3000mg/m2 500mL	点滴静注	2hr	12時間毎		●	●																		
	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●	●																		
8	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30min	12時間毎		●	●																		
	シタラビン 生理食塩液	3000mg/m2 500mL	点滴静注	2hr	12時間毎		●	●																		
	レボホリナート 生理食塩液	25mg 20mL	静注		MTX終了12時間後		●																			
9	レボホリナート 生理食塩液	7.5mg 20mL	静注		6時間毎			●	●																	
	レボホリナート 生理食塩液	7.5mg 20mL	静注		6時間毎			●	●																	
	レボホリナート 生理食塩液	7.5mg 20mL	静注		6時間毎			●	●																	
	レボホリナート 生理食塩液	7.5mg 20mL	静注		6時間毎			●	●																	
10	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●	●																		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																										
2	その他予防薬等																									
3																										