レジメン名	リンパ球除去療法(B-ALL)							
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者		催吐リスク	中等度			
				1コースの日数	5日間			
		1		投与予定回数	1			
内服抗がん剤の有無	なし	7		投与回数上限	1			
※有の場合薬剤名		7						

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)								
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)					
血液毒性								
その他								

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)					休薬完了
1	生理食塩液50ml プロイメンド前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		•				
2	プロイメンド3mg/kg 生理食塩水100ml 3mg/kgを0.6~1.5mg/mllこなるように溶解し、抗がん剤投与の1時間30分前に60分かけて投与	3mg/kg 100ml	点滴静注	100ml/h		•				
3	生理食塩液50ml プロイメンド後フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		•				
4	デキサート注射液0.1mg/kg 生理食塩液50ml	0.1mg/kg 50ml	点滴静注	100ml/h		•	•			
5	グラニセトロン静注液0.04mg/kg 生理食塩液20ml	0.04mg/kg 4ml	静注			•	•			
6	ウロミテキサン注400mg4mL エンドキサン投与直前	200mg/m2	静注			•	•			
7	生理食塩液50ml エンドキサン前フラッシュ用	20ml	点滴静注	125ml/h		•	•			
8	エンドキサン500mg/m2 生理食塩水250ml	500mg/m2 250ml	点滴静注	125ml/h		•	•			
9	生理食塩液50ml エンドキサン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	125ml/h		•	•			
10	生理食塩液50ml フルダラ前フラッシュ用	20ml	点滴静注	200ml/h		•	•	•	•	
11	フルダラ30mg/m2 生理食塩水100ml	30mg/m2 100ml	点滴静注	200ml/h		•	•	•	•	
	生理食塩液50ml フルダラ後フラッシュ用	20ml	点滴静注	200ml/h		•	•	•	•	
13	ウロミテキサン注400mg4mL エンドキサン投与4時間後	200mg/m2	静注			•	•			
14	エントキサン投与8時間後	200mg/m2	静注			•	•			
15										

内服抗がん剤・支持療法薬

	1900-1011 2011 1900-210								
Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5
1									
2									
3									
4									
5									