レジメン名	weeklyドセタキセル単剤療法				
対象がん種	皮膚がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		G-CSF製剤の使用、減量
	血小板減少		輸血
その他	体液貯留		利尿剤の使用
	脱毛		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	ソルデム3A	200mL	点滴静注	80mL/h		●							●							●													
2	デキサート ボララミン 生食	6.6mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●													
3	ドセタキセル 5%　ブドウ糖液	40mg 250mL	点滴静注	250mL/h (day1のみ 200mL/h)		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																