レジメン名	ADR(1日間)				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	500mg/㎡まで
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	心筋傷害、心不全	不明	
	間質性肺炎	不明	投与中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h	13:30-14:00	●																				
2	生食 ブロイメンド デキサート	100ml 150mg 4.95mg	点滴静注	100ml/h	14:00-15:00	●																				
3	生食	50ml	点滴静注	200ml/h	15:00-15:15	●																				
4	ドキソルビシン 生食	75mg/㎡ 100ml	点滴静注	200ml/h	15:15-15:45	●																				
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/h	15:45-16:15	●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カイトリル	2mg	投与前内服			●																				