レジメン名	PER＋ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ＋VNR2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	94.0%	G-CSF
	血小板減少	14.0%	必要時輸血
	FN	12.0%	G-CSF
その他	下痢	27.8%	ロペラミドなどの止瀉薬を使用
	悪心	13.9%	メトクロプラミドなどを使用
	頭痛	13.9%	鎮痛薬を使用

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生食	50ml		100ml/h		●							●												
2	パージェタ 生食	420mg 250ml		500ml/h		●																			
3	トラスツズマブ 注射用水 生食	6mg/kg 0.28ml/kg 250ml		60分		●																			
4	ロゼウス 生食	25mg/m^2 50ml		500ml/h		●							●												
5	生食	250ml		500ml/h		●							●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									