レジメン名	R-GCVP療法3コース目				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	47.5%	G-CSF、抗菌薬など
	血小板減少	31.1%	輸血、薬剤減量など
	貧血	11.4%	輸血、薬剤減量など
その他	感染症	27.9%	抗菌薬など
	嘔吐感	22.9%	
	心関係	16.3%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了							
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●																			
2	オンコビン 生理食塩液	1.4mg/m2 (max 2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/h		●																										
3	エンドキサン 生理食塩液	750mg/m2 250mL	点滴静注	1時間		●																										
4	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m2 100ml	点滴静注	200mL/h		●							●																			
5	ボララビン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/h		●																										
6	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m2 337.5/m2	点滴静注	備考参照		●																										
	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	プレドニン	100mg/body	分1～3 po			●	●	●	●	●																							
2	カイトリル	2mg	化学療法前			●																											
3	イブプロフェン	200mg	リツキシマブ前			●																											
4	その他予防薬等																																
5																																	