レジメン名	ALL-B19大量MTX療法(M5) IR 1～24歳				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	7
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名	ロイケリン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●						
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h	13時	●						
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	100mL/h	13時30分	●						
4	メソトレキセート 生理食塩液	500mg/m2* 100mL	点滴静注	30分	14時	●						
5	メソトレキセート 生理食塩液	4500mg/m2* 500mL	点滴静注	23時間30分	14時30分	●						
6	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		2時	●	●					
7	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		8時	●	●					
8	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		14時	●	●					
9	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	点滴静注		20時	●						
10	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		2時				●			
11	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		8時			●	●			
12	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		14時			●				
13	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		20時			●				
14	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●					
15	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注			●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	ロイケリン	25 mg/m2	就寝前 分1			●	●	●	●	●	●	●
2												
3												
4												
5												