レジメン名	エプキンリ2-3コース目				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28 days
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		G-CSF、抗菌薬など
	貧血		輸血など
	血小板減少		輸血など
その他	サイトカイン放出症候群		トシリズマブ、ステロイドなど
	ICANS		ステロイドなど

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	エプキンリ	48mg	皮下注			●							●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	(プレドニン)	100mg	内服		エプキンリ30分前	●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●			
2	プレドニンは必要時に投与																																