レジメン名	ALL-B19 強化療法(HR1) HR群 CNS3			
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	1～2
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	2
※有の場合薬剤名	デカドロン				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●					●														
2	ブロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h	12時30分	●																			
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	100mL/h	13時	●																			
4	オンコビン 生理食塩液	1.5mg/m2 (max 2mg)50mL	点滴静注	500m/h	13時30分	●					●														
5	メソトレキセート 生理食塩液	500mg/m2* 100mL	点滴静注	30分	14時	●																			
6	メソトレキセート 生理食塩液	4500mg/m2* 500mL	点滴静注	23時間30分	14時30分	●																			
7	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		2時	●	●																		
8	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		8時	●	●																		
9	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		14時	●	●																		
10	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	点滴静注		20時	●																			
11	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		2時				●																
12	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		8時			●	●																
13	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		14時			●																	
14	ロイコボリン 生理食塩液	15mg/m2 20mL	静注		20時			●																	
15	エンドキサン 生理食塩液	200mg/m2250mL	点滴静注	250mL/h	10時			●	●																
16	エンドキサン 生理食塩液	200mg/m2250mL	点滴静注	250mL/h	22時		●	●	●																
17	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg50mL	点滴静注	100mL/h	9時30分					●															
18	キロサイド 生理食塩液	2000mg/m2500mL	点滴静注	3ｈ	10時					●															
19	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg50mL	点滴静注	100mL/h	21時30分					●															
20	キロサイド 生理食塩液	2000mg/m2500mL	点滴静注	3ｈ	22時					●															
21	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg50mL	点滴静注	100mL/h							●					●									
22	ロイナーゼ 5%Glu	25000U/m22.5mL/m2	筋注								●					●									
23	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●	●	●		●														
24	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注			●							●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン	20 mg/m2＊	分1～3 po			●	●	●	●	●																
4	カイトリル	2mg	化学療法前内服						●	●																