レジメン名	JACLS ALL-02(HR) 維持療法2				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液50ml ホスアプレピタント前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h									●													
2	ホスアプレピタント点滴静注用 アロキシ静注0.75mg 生理食塩液50ml	3mg/kg 0.02mg/m2 50ml	点滴静注	100ml/h									●													
3	生理食塩液50ml ホスアプレピタント後フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h									●													
4	生理食塩液50ml オンコビン前フラッシュ用	20ml	点滴静注	150ml/h		●							●							●						
5	オンコビン1mg 生理食塩液50ml	1.5mg/m2 （max 2.0mg） 30ml	点滴静注	150ml/h		●							●							●						
6	生理食塩液50ml オンコビン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	150ml/h		●							●							●						
7	ヒドロコルチゾン注100mg 生理食塩液50ml	50mg 50ml	点滴静注	100ml/h		●														●						
8	ロイナーゼ注1万K単位 ブドウ糖注5%20ml	10,000U/m2 1.0ml/m2	筋注			●							●							●						
9	生理食塩液50ml テラルビシン前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h									●													
10	テラルビシン20mg 生理食塩液100ml	25mg/m2 100ml	点滴静注	100ml/h									●													
11	生理食塩液50ml テラルビシン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h									●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									