レジメン名	JPLSG-AML-20寛解導入療法 ECM　2歳				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	12
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)													休薬完了
1	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3ml	静注			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2	生食50ml （エトポシドルート用）	50mL	点滴静注			●	●	●	●	●								
3	エトポシド 生食 （0.4mg/ml以下に溶解） （メイン止め、フィルター不可）	150mg/m2 500ml	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●								
4	生食 （エトポシドルート用）	50mL	点滴静注			●	●	●	●	●								
5	生食 （ノバントロンルート用）	50mL	点滴静注								●	●	●	●	●			
6	ノバントロン 生食	5mg/m2 100ml	点滴静注	1時間							●	●	●	●	●			
7	生食 （ノバントロンルート用）	50mL	点滴静注								●	●	●	●	●			
8	生食 （キロサイドルート用）	50mL	点滴静注								●	●	●	●	●	●	●	
9	キロサイド 生食	200mg/m2 250ml	点滴静注	12時間							●	●	●	●	●	●	●	
10	生食 （キロサイドルート用）	50mL	点滴静注								●	●	●	●	●	●	●	
10	メソトレキセート キロサイド ヒドロコルチゾンリン酸エステル 注射用水	10mg 25mg 20mg 4mL	髄注			●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	なし																	