レジメン名	Isa単剤（2コース目以降）				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	22.9%	休薬することがある
	好中球減少	18.3%	同上
	血小板減少	18.3%	同上
その他	背部痛	20.2%	鎮痛薬など
	下痢	19.3%	整腸剤など
	infusion reaction	40.4%	中断、ヒドロコルチゾンなど

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●														●													
2	ガスター ボララミン 生理食塩液	20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分		●														●													
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分		●														●													
4	サークリサ 生理食塩液	20mg/kg 計250mLにする	点滴静注	備考を参照		●														●													
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●														●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	アセトアミノフェン	900mg	サークリサ30分前			●														●													
2	レナデックス	40mg	サークリサ30分前			●														●													
3	他、適宜抗真菌薬、ST合剤など																																