レジメン名	Pembrolizumab+CAPOX(1-6サイクル目)				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	6サイクル
※有の場合薬剤名	カペシタビン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	9.0%	減量・中止を行う
	血小板減少	7.0%	減量・中止を行う
	貧血	5.6%	減量・中止を行う
その他	末梢性感覚ニュー	3.0%	減量・中止を行う

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	15分間		●																				
2	キイトルーダ 生食	200 mg 50 mL	点滴静注	30分間		●																				
3	生食	50 mL	点滴静注	15分間		●																				
4	デキサート パロノセトロン 生食	9.9mg 0.75mg 100mL	点滴静注	30分間		●																				
5	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/m² 500 mL	点滴静注	2時間		●																				
6	生食	50 mL	点滴静注	15分間		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カペシタビン	1000mg/回x2	内服			●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						
2	デカドロン錠	8 mg/日	内服				●●	●●																		