

病院フォーミュラー Candida 血症治療 (成人)

血液培養から酵母様真菌が検出
(1本でも陽性となれば、真の菌血症として治療を行う)

過去の真菌検出歴から原因となる真菌の想定可否

想定できる

想定できない

想定される真菌の推奨治療薬を投与する

ミカファンギン注


菌名が判明

Candida sp.

Cryptococcus sp.

血管内デバイス (中心静脈カテーテル、ポートなど) があれば抜去する

アムビゾーム注



推奨治療薬

**ミカファンギン注
プロジフ注**

ミカファンギン注

プロジフ注

臨床経過や感受性結果で
総合的に判断

平日日中に眼科にコンサルトし発症早期と1週間後、2週間後に眼内炎の有無を確認

眼内炎なし

推奨治療薬を継続

眼内炎あり

プロジフ注

**アムビゾーム注
ブイフェンド注 (患者限定医薬品)**

推奨治療薬を継続

臨床経過や感受性結果で
総合的に判断

有効な抗真菌薬を開始 **48 - 96 時間後**に血液培養を再検

経過良好な症例では経口薬への変更を考慮する

フルコナゾールカプセル
ポリコナゾール錠
イトリゾールカプセル/内用液

ポリコナゾール錠

フルコナゾールカプセル
ポリコナゾール錠
イトリゾールカプセル/内用液

ポリコナゾール錠

治療期間は血液培養が陰性となった検体を採取した日から**14日間**
ただし、合併症がある場合の治療期間はより長くなる

注射薬の投与量と薬価

商品名	一般名	負荷投与量	維持量	1日薬価*	備考
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン	—	150mg × 1回	4,605円	
プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	800mg × 1回、2日間	400mg × 1回	12,236円	腎障害時に調整必要 相互作用に注意
ブイフェンド200mg静注用【患者限定医薬品】	ポリコナゾール	6mg/kg × 2回、初日のみ	3~4mg/kg × 2回 TDM必要	11,086円	Ccr < 30mL/minの患者 への投与は避ける 相互作用に注意
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	—	3~5mg/kg × 1回	76,195円	

経口薬の投与量と薬価

*維持量、体重50kg 最大用量で計算

商品名	一般名	負荷投与量	維持量	1日薬価*	備考
フルコナゾールカプセル50mg/100mg「サワイ」	フルコナゾール	—	400mg × 1回	600円	腎障害時に調整必要 相互作用に注意
ポリコナゾール錠200mg「トーフ」	ポリコナゾール	40kg ≥ 300mg × 2回 初日 40kg < 150mg × 2回 初日	40kg ≥ 200mg × 2回 40kg < 100mg × 2回	915.8円 457.9円	食間に服用、TDM必要 相互作用に注意
イトリゾールカプセル50mg	イトラコナゾール	—	200mg × 2回	893.6円	食直後に服用 相互作用に注意
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		—	200mg × 1回	996.0円	空腹時に服用 相互作用に注意