レジメン名	キイトルーダ+パクリタキセル+カルボ3週毎（術前）				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	23.6%	G-CSF製剤の使用、減量の検討
	貧血	25.3%	輸血の検討、減量の検討
その他	嘔気嘔吐	25.5%	
	脱毛	60.2%	
	自己免疫関連症状	33.5%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●							●						
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30分		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
4	デキサート パロノセトロン ファモチジン ボララミン 生食	9.9mg 0.75mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
5	デキサート ファモチジン ボララミン 生食	6.6mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h									●							●						
6	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●							●						
7	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m^2 250mL	点滴静注	1時間		●							●							●						
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC：5 250mL	点滴静注	1時間		●																				
9	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イメンドカプセル	125mg/回	化学療法前			●																				
2	イメンドカプセル	80mg/回	朝食後				●	●																		
3	デカドロン錠	4mg/回	朝・昼食後				●●	●●	●●																	