レジメン名	フェスゴ+wPTX2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
			切除不能進行・再発	投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h		●							●							●						
2	フェスゴMA	10ml （ペルツズマブ600mg トラスツズマブ600mg）	皮下注	5分		●																				
3	デキサート ファモチジン ボララミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h		●							●							●						
4	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h		●							●							●						
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m^2 250 ml	点滴静注	1時間		●							●							●						
6	生食	50 ml	点滴静注	200 ml/h		●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									