


病院フォーミュラー Candida 血症治療（成人）



注射薬の投与量と薬価

商品名	一般名	負荷投与量	維持量	1日薬価※	備考
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギン	—	150mg×1回	4,605円	
プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	800mg×1回、2日間	400mg×1回	12,820円	腎障害時に調整必要 相互作用に注意
ブイフェンド200mg静注用【患者限定医薬品】	ポリコナゾール	6mg/kg×2回、初日のみ	3～4mg/kg×2回 TDM必要	12,020円	Ccr<30mL/minの患者 への投与は避ける 相互作用に注意
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	—	3～5mg/kg×1回	57,355円	

経口薬の投与量と薬価

商品名	一般名	負荷投与量	維持量	1日薬価※	備考
フルコナゾールカプセル50mg/100mg「サワイ」	フルコナゾール	—	400mg×1回	633.2円	腎障害時に調整必要 相互作用に注意
ポリコナゾール錠200mg「トーフ」	ポリコナゾール	40kg≥300mg×2回 初日 40kg<150mg×2回 初日	40kg≥200mg×2回 40kg<100mg×2回	1,027.6円 513.8円	食間に服用、TDM必要 相互作用に注意
イトリゾールカプセル50mg	イトラコナゾール	—	200mg×2回	1,077.6円	食直後に服用 相互作用に注意
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」		—	200mg×1回	996.0円	空腹時に服用 相互作用に注意