レジメン名	AZA療法（静注）				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者		催吐リスク	中等度
	骨髄異形成症候群			1コースの日数	28日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	20.0%	添付文書に準じる。
	貧血	13.7%	
	血小板減少	32.6%	添付文書に準じる。
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	グラニセトロン静注液0.04mg/kg 生理食塩液20ml	0.04mg/kg 4ml	静注			●	●	●	●	●	●	●																					
2	生理食塩液50ml アザシチジン前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●	●	●	●	●	●	●																					
3	アザシチジン75mg/m2 ミズ（注射用水）7.5ml/m2 生理食塩水50ml 実施直前に調整 1瓶に注射用水10mlを注入し激震し完全に溶解 溶解後1時間以内に投与を終了	75mg/m2 7.5ml/m2 50ml	点滴静注	10分		●	●	●	●	●	●	●																					
4	生理食塩液50ml アザシチジン後フラッシュ用	20ml	点滴静注			●	●	●	●	●	●	●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																