レジメン名	2週毎ベバシズマブ(10mg/kg)				
対象がん種	脳腫瘍	対象患者	初発	催吐リスク	最小度
			再発	1コースの日数	14
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	テモゾロミド				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		-	
		-	
		-	
その他	出血	-	
	高血圧	-	
	悪心・嘔吐	-	TMZ(中等度催吐リスク)併用時

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●													
2	アバスチン 生食	10mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分		●													
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	(テモゾロミド 初発時)	75mg/m^2/day 放射線併用期				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	(グラニセトロン)	2mg				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	(テモゾロミド 初発時)	150- 200mg/m^2/day 維持療法期	1-5日目 4週間隔			●	●	●	●	●									
4	(グラニセトロン)	2mg				●	●	●	●	●									