レジメン名	VI療法（3歳以上）				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食 (プロイメンドルート用)	20mL	点滴静注			●																				
2	プロイメンド 生食 (抗がん剤投与90分前に開始)	3mg/kg(max150mg) 50mL (0.6-1.5mg/mLになるように調整)	点滴静注	1hr		●																				
3	生食 (プロイメンドフラッシュ用)	20mL	点滴静注			●																				
4	デキサート 生食	0.1mg/kg 4mL	静注			●																				
5	アロキシ (オンコビン投与直前)	20μg/kg (max1.5mg)	静注			●																				
6	グラニセトロン 生食 (オンコビン投与直前)	0.04mg/kg 4mL	静注										●							●						
7	生食 (オンコビンルート用)	20mL	点滴静注			●							●							●						
8	オンコビン 生食 (フィルター不可)	1.5mg/m^2(max2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/hr（10分）		●							●							●						
9	生食 (オンコビンフラッシュ用)	20mL	点滴静注			●							●							●						
10	生食 (イリノテカンルート用)	20mL	点滴静注			●	●	●	●	●																
11	イリノテカン 5%ブドウ糖 (メイン止め、フィルター不可) (ECGモニター装着)	50mg/m^2(max100mg) 250mL	点滴静注	1.5hr		●	●	●	●	●																
12	生食 (イリノテカンフラッシュ用)	20mL	点滴静注			●	●	●	●	●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									