レジメン名	FOLFOXIRI+Bmab(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)				
対象がん種	大腸がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	14
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		
その他	下痢		抗コリン薬、止瀉剤の使用。CPT-11
	末梢神経障害		L-OHP減量・休薬。
	高血圧		降圧剤内服。B-mabの休薬。

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/hr		●													
2	プロイメンド 生食	150 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/hr		●													
3	デキサート アロキシ 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	216 mL/hr		●													
4	ベバシズマブ 生食	5mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目以降30分 投与後生食フラッシュ		●													
5	イリノテカン 5%ブドウ糖注	165 mg/m^2 250 mL	点滴静注	1時間		●													
6	レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m^2 250 mL	点滴静注	125 mL/hr オキサリプラチンと同時投与		●													
7	オキサリプラチン 5%ブドウ糖注	85 mg/m^2 250 mL	点滴静注	2時間 レボホリナートと同時投与		●													
8	フルオロウラシル 生食	3200 mg/m^2 50 mL(調節)	持続静注			●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8 mg/day	朝・昼食後(朝食後)				●●	●●											