レジメン名	ALL-B19 寛解導入療法(IA4): IR, HR群　CNS2, 3				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●				●			●			●			●	●		●			●		●	●			●		
2	オンコビン 生理食塩液	1.5mg/m2 (max 2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/h		●							●							●							●						
3	ダウノマイシン 生理食塩液	30mg/m2 100mL	点滴静注	1時間		●							●							●							●						
4	ロイナーゼ 5%ブドウ糖液	5000U/m2 ＊ 200ml	点滴静注	1時間						●			●			●			●			●			●			●			●		
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●				●			●			●			●	●		●			●		●	●			●		
6	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注							●						●									●						●		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	プレドニン	60 mg/m2＊	分3 po (or iv)			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●									
2	プレドニン	30 mg/m2	分3 po (or iv)																								●●●	●●●	●●●						
3	プレドニン	15 mg/m2	分3 po (or iv)																											●●●	●●●	●●●			
4	プレドニン	7.5 mg/m2	分3 po (or iv)																														●●●	●●●	●●●
5	カイトリル	2mg	化学療法前内服			●							●							●							●								