

レジメン名	R-MPV (1コース目)				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	14 days
				投与予定回数	5
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	7
※有の場合薬剤名	プロカルバジン				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	輸血
	血小板減少	輸血
	好中球減少	抗菌薬、G-CSF
その他	腎不全	薬剤の減量、補液

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●	●												休薬完了
2	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30min			●													
3	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m ² 337.5mL/m ²	点滴静注	備考参照			●													
4	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr				●												
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr				●												
6	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	110mL/hr				●												
7	メソトレキセート 生理食塩液	3500mg/m ² 500mL	点滴静注	2hr	10時			●												
8	オンコピン 生理食塩液	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mL	点滴静注	500mL/hr				●												
9	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		4時				●	●										
10	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		10時			●	●	●										
11	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		16時			●	●											
12	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		22時			●	●											
13	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●	●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	プロカルバジン(奇数コースのみ)	100mg/m ²	分1			●	●	●	●	●	●	●						