レジメン名	SMILE(オンキャスパー)				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	2回
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	2回
※有の場合薬剤名	なし				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）																												休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注		ルート確保用	●	●	●	●	●			●																				
2	パロノセトロン 生理食塩水	0.75mg 50ml	点滴静注	15分		●																											
3	メトトレキサート 生理食塩水	2000mg/m2 500ml	点滴静注	6時間	10時	●																											
4	デキサート 生理食塩水	39.6mg 50ml	点滴静注	30分			●	●	●																								
5	イホマイド 生理食塩水	1500mg/m2 500ml	点滴静注	3時間			●	●	●																								
6	ウロミテキサン 生理食塩水	300mg/m2 20ml	静注	イホマイド投与直後			●	●	●																								
7	エトポシド 生理食塩水	100mg/m2 500ml	点滴静注	2時間			●	●	●																								
8	ウロミテキサン 生理食塩水	300mg/m2 20ml	静注	イホマイド投与4時間後			●	●	●																								
9	ウロミテキサン 生理食塩水	300mg/m2 20ml	静注	イホマイド投与8時間後			●	●	●																								
10	レボホリナート 生理食塩水	12mg 20ml	静注		4時			●	●	●																							
11	レボホリナート 生理食塩水	12mg 20ml	静注		10時		●	●	●	●																							
12	レボホリナート 生理食塩水	12mg 20ml	静注		16時		●	●	●																								
13	レボホリナート 生理食塩水	12mg 20ml	静注		22時		●	●	●																								
14	オンキャスパー 注射用水 生理食塩水	2000IU/m2 1バイアル5.2mlで溶解 100ml	点滴静注	1時間									●																				
15	生理食塩水	50ml	点滴静注		ルート確保用	●	●	●	●	●			●																				
	その他、重曹入りの補液（2000mL/m2）を行い、MTX開始12時間前からダイアモックス1TあるいはI/2A ivをMTX濃度が低下するまで、1日2～3回																																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																