レジメン名	Necitumumab維持療法				
対象がん種	肺がん	対象患者	初発	催吐リスク	軽度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	低Mg血症		適宜注射Mg補正液により補充
	皮膚障害		休薬、減量、中止検討
	血栓塞栓症		投与中止検討

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	200mL/hr		●							●													
2	生理食塩水 ポートラーザ注	250ml 800mg	点滴静注	1時間		●							●													
3	生理食塩水	50ml	点滴静注	200mL/hr		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									