ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		医師名
					測定日		測定日		測定日		
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSEX	@PATIENTBIRTH	ENTAGEFORM	HEIGHT01_D	cm	WHEIGHT01_D	kg	#VALUE!	m^2	@USERNAME
					$HEIGHT02_Doc		$WHEIGHT02_Doc		1900/1/0		

レジメン名	腔癌　P-mab+RT(High risk)【1−3コース目用				
対象がん種	頭頸部がん	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	3
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	3
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球低下	11.6%	grade3以上5.3% 感染対策　G-CSF
	白血球数低下	10.8%	grade3以上3.6%　同上
	貧血	2.2%%	grade3以上2.2%　輸血　延期　減量
その他	放射線性皮膚炎	39.3%	grade3以上4.2%　ステロイド剤使用
	口内炎	38.8%	grade3以上11.6%　口腔ケア　栄養
	甲状腺機能低下症	19.4%	grade3以上なし

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	RT1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																			
2	キイトルーダ 生食	200mg 50ml	点滴静注	30分		●																			
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●																			
4	ヴィーンD 硫酸Mg	500ml 8mEq	点滴静注	2時間		●																			
5	ソルデム3A	500ml	点滴静注	2時間		●																			
6	アロカリス パロノセトロン デキサート 生食	235mg 0.75mg 9,9mg 100ml	点滴静注	30分		●																			
7	生食	50ml	点滴静注	15分		●																			
8	シスプラチン 生食	100mg /mm2 500ml	点滴静注	2時間		●																			
9	ソルデム3A	500ml	点滴静注	2時間		●																			
10	ソルデム3A	500ml	点滴静注	2時間		●																			
11	ラシックス	20mg	静注			●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																										