レジメン名	ニュベクオ＋ドセタキセル				
対象がん種	前立腺癌	対象患者	ホルモン感受性	催吐リスク	なし
			遠隔転移あり	1コースの日数	21日
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名	ニュベクオ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	5.1%	
	好中球減少	0.6%	
その他	肝機能障害		
	疲労		
	末梢性ニューロパチー		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	30分		●																				
2	生食 デキサート注 ポララミン注	50ml 6.6mg 5mg	点滴静注	30分		●																				
3	ブドウ糖注5% ドセタキセル注	250ml 75mg/m2	点滴静注	1時間		●																				
4	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニュベクオ錠	1回600mg、1日2回	食後内服			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●