レジメン名	TriTC+ベバシズマブ3週間毎				
対象がん種	卵巣がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	2～6
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		
	静脈血栓症		
	発熱性好中球減少		
その他	高血圧		
	疼痛		
	創傷治癒遅延による合併症		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
2	デキサート ガスター ボララミン 生食	8.25mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
4	パクリタキセル 5%ブドウ糖	175mL/㎡ 500mL	点滴静注	3時間		●																				
5	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC：6 250mL	点滴静注	1時間		●																				
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
7	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分		●																				
8	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン	2mg/day	投与前内服			●																				
2	イメンド	125mg/day	投与前内服			●																				
3	イメンド	80mg/day	分1				●	●																		
4	デカドロン	8mg/day	分2				●●	●●																		