レジメン名	wPAC100mg/m2(パクリタキセル単剤)3投1休				
対象がん種	皮膚がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		G-CSF製剤の使用
その他	倦怠感		
	筋肉痛、関節痛		
	神経障害		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●							●												
2	生食 ガスター デキサート ボララミン	100mL 20mg 3.3mg 5mg	点滴静注	200mL/h		●							●							●												
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●							●												
4	パクリタキセル 5%ブドウ糖注	100mg/㎡ 250mL	点滴静注	1時間		●							●							●												
5	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●												
6	ヘパリンロック10単位/mL	1筒				●							●							●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															