レジメン名	イリノテカン単剤療法(B法)				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少		
	貧血		
その他	悪心・嘔吐		
	下痢		開始前UGT1A1遺伝子多型確認検討
	脱毛		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●													
2	デキサート アロキシ 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
3	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m^2 250 mL	点滴静注	170 mL/h		●													
4	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8mg/day	朝・夕食後(朝食後)				●●	●●											