レジメン名	IsaKd療法（1コース目）				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	99.0%	休薬することがある
	好中球減少	55.0%	同上
	血小板減少	94.0%	同上
その他	高血圧	37.0%	降圧薬など
	下痢	36.0%	同上
	infusion reaction	46.0%	中断、ヒドロコルチゾンなど

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●						●	●						●	●						●						
2	ガスター ボララミン 生理食塩液	20mg 5mg 50mL	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	200ml/h		●							●							●							●						
4	サークリサ 生理食塩液	10mg/kg 計250mLにする	点滴静注	備考を参照		●							●							●							●						
5	5%ブドウ糖	50mL	点滴静注	200ml/h		●	●						●	●						●	●												
6	カイプロリス ミズ 5%ブドウ糖	20mg/m2 10ml/m2 100mL	点滴静注	30分		●	●																										
7	カイプロリス ミズ 5%ブドウ糖	56mg/m2 28ml/m2 100mL	点滴静注	30分									●	●						●	●												
8	5%ブドウ糖	50mL	点滴静注	200ml/h		●	●						●	●						●	●												
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●						●	●						●	●						●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール	900mg	サークリサ30分前			●							●							●							●						
2	レナデックス	20mg	サークリサ30分前			●							●							●							●						
3	レナデックス	20mg	1日1回朝				●							●							●							●					
4	他、適宜抗真菌薬、ST合剤など																																