| レジメン名     | ペムフ  | ペムブロリズマブ+ベバシズマブ維持療法 |       |         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------|---------------------|-------|---------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 対象がん種     | 子宮頸癌 | 対象患者                | 進行、再発 | 催吐リスク   | 最小度                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l         |      |                     |       | 1コースの日数 | 21日間                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |      |                     |       | 投与回数上限  | ペムブロリズマブは35<br>サイクルor再発、非許<br>容の副作用まで |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内服抗がん剤の有無 | なし   |                     |       | 投与回数上限  | ベバシズマブは再発、<br>非許容の副作用まで               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※有の場合薬剤名  |      | 7                   |       |         |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) *試験全体 |          |       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項                            | iΒ       | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など)      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血液毒性                         | 貧血       | 60.0% |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | 好中球減少    | 71.0% | Grade2で休薬         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | 血小板減少    | 37.1% | Grade2で休薬、G3で次回減量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他                          | 神経系障害    | 88.6% |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | 胃腸障害     | 77.1% |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | 免疫関連有害事象 | 42.9% | Grade2-3で中止や休薬    |  |  |  |  |  |  |  |  |

## レジメン内容(支持療法を含む)

|   |     |     |                  |      |         | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   |
|---|-----|-----|------------------|------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| R | 落   | 薬剤名 | 投与量              | 投与方法 | 投与速度·時間 | 投与時刻(必要時) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 休薬完了 |
|   | 1 4 | 生食  | 50mL             | 点滴静注 | 15分     | 9:00      | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|   | 2 4 |     | 50mL<br>200mg    | 点滴静注 | 30分     | 9:15      | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| Г | 3 4 | 生食  | 50mL             | 点滴静注 | 15分     | 9:45      | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|   | 4 5 |     | 100mL<br>15mg/kg | 点滴静注 | 30分     | 10:15     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|   | 5 4 |     |                  | 点滴静注 | 30分     |           | • |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

| 内服抗がん剤・支持療法 | 薬   |    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |
|-------------|-----|----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|
| Rp 薬剤名      | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21            |
| 1 な1.       |     |    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -  |    | $\overline{}$ |