レジメン名	ペムブロリズマブ＋TC				
対象がん種	子宮頸癌	対象患者	進行、再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PTX＋CBDCA は6サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	ペムブロリズマブ は35サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	60.0%	
	好中球減少	71.0%	Grade2で休薬
	血小板減少	37.1%	Grade2で休薬、G3で次回減量
その他	神経系障害	88.6%	
	胃腸障害	77.1%	
	免疫関連有害事象	42.9%	Grade2-3で中止や休薬

レジメン内容（支持療法を含む）　**＊アバスチンを除いたレジメン**

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	15分	9:00	●																				
2	生食 キイトルーダ	50mL 200mg	点滴静注	30分	9:15	●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分	9:45	●																				
4	デキサート ファモチジン ボララミン 生食	8.25mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	30分	10:00	●																				
5	生食	50mL	点滴静注	30分	10:30	●																				
6	ブドウ糖5% パクリタキセル	500mL 175mg/m^2	点滴静注	3時間	11:00	●																				
7	ブドウ糖5% カルボプラチン	250mL AUC5	点滴静注	1時間	14:00	●																				
8	生食	50mL	点滴静注	30分	15:00	●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イメンド	125mg	パクリタキセル投与の1時間前			●																				
2	グラニセトロンゼリー	1包	パクリタキセル投与の1時間前			●																				
3	イメンド	80mg	午前中				●	●																		
4	デカドロン	8mg	午前中				●	●																		