

レジメン名	RAM+DOC				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	規定なし	
※有の場合薬剤名			投与回数上限	規定なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	38.9%	G-CSF製剤の予防的使用を考慮
	貧血	20.9%	
	発熱性好中球減少症	15.9%	
その他	高血圧	10.2%	降圧薬使用、休薬
	深層性感覚ニューロパシー	11.6%	
	出血	9.6%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				休薬完了	
2	生食 ボラミン注 デキサート	100mL 5mg 6.6mg	点滴静注	200mL/h			●																					
3	サイラムザ 生食	10mg/kg 250mL	点滴静注	1時間 (初回忍容性良好であれば2回目以降30分)			●																					
4	生食	100mL	点滴静注	100mL/h			●																					
5	ドセタキセル 5%ブドウ糖注	60mg/m ² 250mL	点滴静注	250mL/h			●																					
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	なし																										

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h

②
点滴静注

生食	100mL
ボラミン注	5mg
デキサート	6.6mg

30分

③
点滴静注

サイラムザ	10mg/kg
生食	250mL

備考欄参照

④
点滴静注

生食	100mL
----	-------

100 ml/h

⑤
点滴静注

ドセタキセル	60mg/m ²
5%ブドウ糖注	250mL

250 ml/h

フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不
1時間(初回忍容性良好であれば2回目以降30分)

1-2コース目は1時間の経過観察用
3コース目以降は400mL/hrでも可

フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不